

PRONTO SOCCORSO

Scopo di questo formulario é essere d'aiuto ai proprietari di cani e gatti che si trovano confrontati con situazioni di emergenza. Il contenuto e le brevi istruzioni sono concepiti per i primi soccorsi da prestare sul posto prima di recarsi dal veterinario più vicino.

La cosa più importante in caso di urgenza è **mantenere la calma** e questo per due motivi:

-Le decisioni prese e i primi soccorsi saranno sicuramente effettuati in maniera più razionale ed i risultati saranno migliori!

-L'animale ferito, dolorante o spaventato, vedendo il padrone tranquillo, tenderà ad essere più cooperativo.

ATTENZIONE: Molto spesso l'animale ferito o sotto stress ha delle reazioni inaspettate e può mordere anche il proprietario!! Prima di effettuare qualsiasi manipolazione, prendete le precauzioni necessarie per evitare di essere feriti:

-Gatti: avvolgerlo in una coperta per evitare di venire graffiati e morsi.

-Cani: Passate una cordicella attorno al muso e fissatela dietro le orecchie. Appena terminate le manipolazioni la museruola va levata in modo da lasciare respirare liberamente il cane. Attenzione: da evitare in cani con vomito, problemi respiratori e ferite nella zona del muso.

Acqua più volte e in piccole quantità, ev. inumidire le mucose della bocca se l'animale è ancora cosciente. Non dare niente da mangiare!!

- Avvelenamenti

In casi di ingestione di veleni il fattore tempo é determinante!. Una pronta terapia sintomatica permette spesso di salvare la vita al proprio animale. Importantissimo é conoscere il tipo di veleno ingerito per cui é assolutamente indispensabile portare dal veterinario resti della sostanza ingerita e la confezione originale. In attesa di raggiungere il veterinario telefonate al centro tossicologico dove potete ricevere utili informazioni.

(Centro tossicologico per la Svizzera 24 ore su 24: 01/2515151)

- Ingestione di corpi estranei

Molti cani, soprattutto cuccioli, sono specialisti nell'ingerire ogni tipo di corpo estraneo. I gatti hanno invece la predilezione per fili ed elastici. Di regola un corpo estraneo resta nello stomaco per ca. 2-4 ore ed é quindi molto importante recarsi subito dal veterinario prima che passi nell'intestino, dove potrebbe provocare un'occlusione. Se il corpo estraneo resta incastrato in gola e vi sono problemi respiratori é essenziale estrarlo al più presto. Se non riuscite ad afferrarlo attraverso la bocca date dei forti colpi bilateralmente sul torace e se l'animale non pesa troppo sollevatelo tenendolo a testa in giù.

- Ferite senza emorragia (morsi, tagli, traumi, abrasioni ecc.)

In questo caso generalmente non vi sono pericoli per la vita. La ferita va mantenuta pulita e protetta per evitare contaminazione e ulteriori complicazioni. Tagliate i peli attorno alla ferita, lavatela abbondantemente con una soluzione disinfettante e proteggetela con una garza inumidita o un bendaggio.

- Ferite con emorragia

Spesso le ferite possono sanguinare abbondantemente (unghie e polpastrelli!!), un reale pericolo per la vita dell'animale sussiste solo nel caso di importanti lesioni alle arterie. Applicate delle garze sterili sulla ferita e se possibile effettuate un bendaggio compressivo. Se l'emorragia persiste applicate un laccio emostatico a monte della ferita stringendo progressivamente (ricordatevi di allentarlo ogni 15-20 minuti!!). Evitate di muovere l'animale e trasportatelo con il telo termico o una coperta, mantenendo la parte ferita sopra. Attenzione! in caso di ferite al torace con sospetta perforazione, la parte ferita deve stare di sotto!

- Fratture, lussazioni

Si possono riconoscere a prima vista (fratture aperte, deviazioni anomale degli arti) o tramite manipolazione (crepitazione, dolori molto forti). Ideale sarebbe stabilizzare la parte lesa con un bendaggio e una stecca. Nella pratica spesso è meglio evitare di toccare l'arto fratturato o lussato in modo da evitare ulteriore stress e dolore. Importantissimo è trasportare l'animale con un telo per evitare che possa ferirsi ulteriormente. Le manipolazioni possono essere molto dolorose..ev. mettere la museruola!!!

- Forti traumi e contusioni (cadute, automobili ecc.) con lesioni interne

Le lesioni interne più frequenti sono emorragie polmonari o addominali, rottura della vescica, ernia diaframmatica e perforazione del polmone con pneumotorace. Queste lesioni inizialmente possono essere poco evidenti e lo stato generale del paziente buono. Dopo gravi traumi è sempre consigliato recarsi al più presto dal veterinario evitando di muovere troppo il ferito. Da controllare il colore delle mucose (gengive, lingua, congiuntive), la respirazione e lo svuotamento della vescica.

- Traumi cranici e perdita di coscienza

Complicazioni temute dopo gravi traumi cranici sono commozione ed ematomi cerebrali. Inizialmente i sintomi sono un leggero stato confusionale che peggiora gradualmente fino ad arrivare alla perdita di coscienza, coma o a manifestazioni neurologiche gravi come epilessia, crampi, aggressività ecc.. Recatevi al più presto dal veterinario cercando di stressare il meno possibile l'animale. In caso di perdita di coscienza controllate che la lingua non cada all'indietro e trasportate l'animale adagiato su di un fianco con il collo disteso per prevenire problemi in caso di vomito.

- Punture d' insetti

Normalmente dopo un morso d'insetto si osserva una reazione locale con dolore ed edema. In alcuni casi il muso dell'animale può gonfiarsi notevolmente. Estraiete il pungiglione con la pinzetta e effettuate degli impacchi freddi. Se vi sono difficoltà di deglutizione e salivazione (edema della laringe!) date da bere più volte acqua fredda e trasportate l'animale dal veterinario evitando ogni stress.

- Punture d'insetti con grave reazione allergica (shock anafilattico)

Lo shock si manifesta con incoordinazione motoria, difficoltà respiratorie, salivazione, tremito, tachicardia, pallore delle mucose fino alla perdita di coscienza. L'animale va tenuto al caldo e trasportato dal veterinario il più velocemente possibile. In casi di nota allergia (es. morso di vespa) è consigliabile disporre di un prodotto antiallergico da iniettare sul posto.

- Morso di serpente

Fortunatamente alle nostre latitudini la maggioranza dei serpenti non sono velenosi, il loro morso causa però una forte reazione locale molto dolorosa e nei soggetti allergici può causare shock anafilattico. La zona colpita va lavata abbondantemente con un disinfettante e si consigliano impacchi freddi per moderare la reazione infiammatoria locale che arriva a causare delle necrosi. La visita dal veterinario è indispensabile.

In caso di serpenti velenosi, oltre al trattamento sopra descritto, va applicato il laccio emostatico a monte della ferita per rallentare l'entrata in circolo del veleno, il paziente va trasportato su di un telo.

- Ustioni

Lavate abbondantemente la zona colpita con acqua fredda per ridurre l'infiammazione. L'intervento del veterinario è indispensabile. Le ustioni infatti, anche se superficiali, possono essere molto difficili da guarire e dare origine a complicazioni come shock e gravi infezioni batteriche.

- Colpo di calore (la migliore terapia è la prevenzione!!)

La temperatura corporea può raggiungere i 42-43 gradi! Abbassate la temperatura gradualmente bagnando il corpo con acqua fredda o alcol, tranquillizzate l'animale e recatevi al più presto dal veterinario (edema cerebrale!)

- Scossa elettrica

Problema abbastanza frequente nei cuccioli. Una forte scossa può provocare perdita di coscienza, edema cerebrale, problemi cardiocircolatori. Spesso si possono osservare gravi lesioni e necrosi alla mucosa della bocca e sulla lingua. Se l'animale è ancora cosciente, lavate abbondantemente con acqua fredda la parte lesa così da ridurre la reazione infiammatoria e la necrosi. In caso di perdita di coscienza recatevi al più presto dal veterinario.

-Lesioni agli occhi

Le emergenze a livello oculare come ferite, traumi, contatto con sostanze

irritanti ecc. necessitano di un trattamento immediato. Lavate abbondantemente con acqua fresca. Proteggete l'occhio ferito con una garza sterile inumidita con acqua e recatevi dal veterinario.